

الحملة الوطنية للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي أ الصفيحة



بالنظافة بتحمي حالي
و بتحمي عيلاتك ...



كيفية غسل اليدين:

1. بلل يديك بماء نظيف
2. ضع كمية كافية من الصابون في باطن اليد
3. افرك يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع التأكد من فرك باطن و ظاهر اليدين و بين الأصابع بما فيها الإبهام و تحت الأظافر و المعصم
4. أغسل مجدداً يديك بالماء جيداً
5. جفف يديك بمحرمة نظيفة
6. استخدم محرمة نظيفة لإغلاق مصدر الماء



تعقيم المياه، الخضار والفاواكه باستخدام الكلور

استخدم سائل الكلور المنزلي الحالي من الرائحة المعطرة (الذي يحتوي على 5.25 % كلور).

- زيادة نقطتين من سائل الكلور لكل لิتر 1 من الماء.
- زيادة 40 نقطة أو 2 مل أو ربع ملعقة صغيرة من سائل الكلور لكل 20 لি�تر ماء.
- انتظر نصف ساعة (30 دقيقة) قبل استعمال الماء أو شربه.
- بالأمكان تعقيم الخضار و الفواكه عبر تركها في المياه المعقمة بالكلور لمدة نصف ساعة قبل تناولها.

- الوقاية من مرض التهاب الكبد الفيروسي أ**
يمكن الحد من انتشار المرض عن طريق ما يلي:
- استخدام المياه النظيفة والمعقمة للشرب.
 - استخدام المياه النظيفة للاستعمال.
 - استعمال المرحاض النظيف.
 - التخلص من مياه الصرف الصحي بطرق سليمة.
 - المحافظة على نظافة المرحاض بشكل دائم.
 - اتباع ممارسات النظافة الشخصية، و خاصة غسل اليدين قبل تحضير وتناول الطعام وبعد استعمال المرحاض.
 - غسل اليدين بعد تغيير حفاضات الأطفال.
 - عدم المشاركة في أدوات الطعام والشرب.
 - غسل الخضار والفاواكه جيداً بالمياه المعقمة.
 - تلقيح جميع الأطفال ابتداء من عمر سنة ضد المرض.
 - إعطاء جرعة واحدة من اللقاح في غضون أسبوعين اثنين من التعرض للعدوى يمكن أن يعطي وقاية من الاصابة.



حقائق أساسية

- الالتهاب الكبدي أو مرض فيروسي يصيب الكبد ويسبب أعراضًا مرضية تتراوح بين البسيطة والخطيرة.
- ينتقل فيروس الالتهاب بتناول الطعام الملوث أو المياه الملوثة أو بالاتصال المباشر بشخص مصاب بالعدوى.
- يرد سبب الإصابة بالالتهاب الكبدي إلى تلوث مياه الشرب وأو الاستخدام وتردي خدمات الصرف الصحي.
- يمكن أن ينتشر المرض بسرعة على نطاق واسع خاصة في غياب النظافة الصحية و عند استعمال الأماكن العامة للتبرز.

أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي أ

- تتراوح عادة فترة الحضانة بين 14 و 28 يوما.
- تختلف أعراض الإصابة بين معتدلة وشديدة، وقد تشمل واحد أو أكثر من هذه العوارض:
 - الحمى
 - التوعك
 - فقدان الشهية
 - الإسهال والغثيان
 - ألم في البطن
 - بول غامق اللون
 - الإصابة باليرقان (اصفرار الجلد والعينين).


- إن الأطفال المصابين دون سن السادسة من العمر قد لا يبدون أعراضًا ظاهرة للمرض مع ذلك بإمكانهم نشر العدوى.
- تنسب العدوى في ظهور أعراض أشد حدة على الأطفال الأكبر سنا و البالغين وتكون مصحوبة باليرقان في أكثر الحالات.

علاج المرض

- لا يوجد علاج محدد لعلاج الالتهاب الكبدي أ.
- يتسم الشفاء من أعراض الإصابة بوتيرة بطئية ويستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
- يجب الحفاظ على راحة المريض وتمتعه بتوازن غذائي مستقر، والتغويض عمّا فقده من سوائل بسبب التقيؤ والإسهال.
- لا يوجد داع لاستعمال أدوية المضادات الحيوية، فإن استعمالها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

طرق انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي أ

- تحت الإصابة عندما يتناول شخص غير مصاب أغذية أو مياه ملوثة ببراز شخص مصاب بالعدوى.
- من الممكن نقل العدوى عن طريق لعب شخص مصاب.
- عن طريق الاتصال الجسدي المباشر بشخص مصاب.
- ينتقل في المنزل من الشخص المصاب إلى الآخرين عن طريق استعمال المرحاض غير النظيف والمشاركة في استعمال أدوات الطعام.



طرق إنتقال العدوى



تنظيف الحمام بالماء والكلور بشكل دائم وخاصة بعد استعماله من قبل المريض...