



الجمهورية اللبنانية

وزارة الصحة العامة

المديرية العامة للصحة

١١ رقم المحفوظات :

٢٠١٥ تاريخ : ١٩ بيروت في

قرار رقم ٢٤٤٩

اعتماد معايير إرشادية لتشخيص وعلاج ترقق العظام

إن مدير عام وزارة الصحة العامة ،

بناءً على المرسوم رقم ٣٦٥٤ تاريخ ١٩٩٣/٦/١٨

بناءً على توصيات اللجنة الوطنية لترقق العظم المشكلة بالقرار رقم ١/٢٩٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٤

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: لا يوجد ضرورة لطلب فحص كثافة المعادن في العظم (osteodensitometry) للرجال والنساء إلا عند توفر أحد المعطيات التالية:

- بعد عمر ال ٦٥ سنة.
- وجود تشوه في العمود الفقري أو كسور ناتجة عن هشاشة العظام.
- أدلة عن زوال التمعدن العظمي وفقاً لفحوص الأشعة.
- علاج مزمن بالستيرويدات القشرية (الغلووكورتيكoid) (لمدة تزيد عن ٦ أشهر).
- العلاج بمثبّطات الأروماتاز (Aromatase inhibitors) أو العلاج بمضاد الأندروجين (anti-androgen therapy).

المادة الثانية: بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، يجب قياس كثافة المعادن في العظم (osteodensitometry) إذا كانت نسبة الخطر ١٠% أو أكثر وفقاً لأداة FRAZ* لمنظمة الصحة العالمية (WHO) المتعلقة بتقييم مخاطر الكسور.

المادة الثالثة: يخضع للعلاج النساء بعد انقطاع الطمث والرجال ما فوق سن الخمسين إذا توفّرت أحدي المعطيات التالية:

- سوابق كسر ناتج عن هشاشة العظام في العمود الفقري أو الورك.
- كسرین أو أكثر ناتجين عن هشاشة العظام في الموضع الأخرى.
- جميع الحالات الأخرى يجب استخدام أداة **FRAX*** والعلاج بحسب معايير العمر.

المادة الرابعة: تستعمل الأدوية وفقاً للجدول التالي:

الرجال المصابين بترقق العظام	الرجال والنساء المعالجين بالغلوكورتيكoid	النساء بعد إنقطاع الطمث		الدواء
	العلاج	الوقاية	العلاج	الوقاية
				✓ الإستروجين
			✓	الكلسيتونين
✓	✓		✓	الأندرونات
✓	✓	✓	✓	الريزدرونات
			✓	الإبندرونات
✓	✓	✓	✓	حمض
				الزوليبرونيك
			✓	الراوكسيفين
			✓	الدينوسوماب
✓	✓		✓	التيريباراتيد

*<http://www.moph.gov.lb/MedicalCare/PatientSafety/Pages/OsteoporosisAssessmentandTreatment.aspx>



مدير عام وزارة الصحة العامة
د. وليد عمار

بلغ:

- معالي الوزير
- المديرية العامة للصحة
- مديرية العناية الطبية
- مديرية الوقاية الطبية
- الموقع الإلكتروني للوزارة
- المحفوظات